

Patientinformation

Udrensning af tyktarmen med Picoprep forud for koloskopi

Picoprep anvendes til tømning af tarmen før en kikkertundersøgelse.

HVORDAN FOREGÅR UDRENSNINGEN?

Tilberedning af opløsning:

1. dosis Picoprep opløses i et lille glas (ca. 1,5 dl) koldt postevand under omrøring i 2-3 minutter og drikkes straks kl 22 dagen før undersøgelsen.
2. dosis Picoprep opløses i et lille glas (ca. 1,5 dl) koldt postevand under omrøring i 2-3 minutter og drikkes straks kl 9 om morgenen den dag du skal undersøges.

Bemærk: Den første time efter at du har indtaget udrensningsmidlet skal du ikke drikke. Herefter er det vigtigt at du drikker 250 ml/2.5 dl klare væsker, helst vand, hver time, så længe tarmudrensningen foregår. Det svarer til ca 2-2½ l væske i løbet af hele udrensningen. Du skal ikke drikke væske de sidste 2 timer før undersøgelsen.

BIVIRKNINGER

Nogle oplever kvalme, hovedpine, opkastninger, mavesmerter

HVEM MÅ IKKE GENNEMFØRE UDRENSNING MED PICOPREP?

Hvis du har dårligt fungerende nyrer, alvorlig sygdom i muskelvæv, hjertesvigt, svære betændelsestilstande i tyktarme, eller får vanddrivende behandling må du ikke indtage Picoprep. Kontakt Kirurgiklinikken i så fald

BRUG AF ANDEN MEDICIN

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. Picoprep kan nedsætte virkningen af andre lægemidler, der tages gennem munden, fx p-piller. Anden medicin bør derfor tages mindst 1 time før Picoprep.

Du er meget velkommen til at kontakte Kirurgiklinikken, såfremt du har spørgsmål

Kirurgiklinikken
Overlæge, dr.med.
Steffen Rosenstock

Søborg Torv 12, 3.sal
2860 Søborg
Tlf. 42 66 01 69
sro@kirurgiklinikken.dk

Konsultation:
Onsdag kl. 16-21
eller efter aftale

Tidsbestilling:
Mandag - Fredag kl. 17-18